

Dénomination du médicament

LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé
Lévonorgestrel

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien, votre infirmier/ère ou votre centre de planning familial.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre centre de planning familial pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ?
3. Comment prendre LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : contraception d'urgence ? code ATC : G03AD01

LEVONORGESTREL VIATRIS est une contraception d'urgence orale.

Qu'est-ce que la contraception d'urgence ?

La contraception d'urgence est une méthode de rattrapage qui vise à éviter la grossesse après un rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec de la méthode de contraception.

Quand utiliser cette contraception d'urgence ?

Cette contraception d'urgence doit être utilisée le plus tôt possible, de préférence dans les 12 heures et au plus tard dans les 72 heures (3 jours), après le rapport sexuel non protégé, ou en cas d'échec de la méthode de contraception. Elle est plus efficace si vous la prenez dès que

possible après un rapport sexuel non protégé. LEVONORGESTREL VIATRIS ne permet d'éviter une grossesse que si vous le prenez dans les 72 heures qui suivent un rapport sexuel non protégé. Il ne fonctionne pas si vous êtes déjà enceinte. Si vous avez des rapports sexuels non protégés après avoir pris LEVONORGESTREL VIATRIS, LEVONORGESTREL VIATRIS ne permettra pas d'éviter une grossesse.

Il a été démontré que LEVONORGESTREL VIATRIS pouvait prévenir de 52 % à 85 % des grossesses attendues.

Si vous soupçonnez que vous pouvez tomber enceinte pour l'une des raisons suivantes :

- si vous avez eu des rapports sexuels sans méthode de contraception ;
- si vous avez oublié de prendre votre pilule contraceptive à temps ;
- si le préservatif de votre partenaire s'est rompu, a glissé ou est tombé ;
- si vous craignez que votre stérilet ait été expulsé ;
- si votre cape contraceptive ou votre diaphragme s'est déplacé ou si vous les avez retirés trop tôt ;
- si vous craignez un échec de la méthode du rapport sexuel interrompu ou de la méthode des températures ;
- en cas de viol.

LEVONORGESTREL VIATRIS fonctionne en empêchant vos ovaires de libérer un œuf. Il ne peut pas empêcher un œuf fécondé de se fixer dans l'utérus.

Ce comprimé ne sert que de méthode de contraception d'urgence ; il ne s'agit pas d'une méthode de contraception régulière du fait qu'elle est moins efficace que la pilule contraceptive « normale » (« la pilule »).

LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé n'est pas indiqué avant le premier saignement menstruel (la puberté).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé dans le cas suivant :

- si vous êtes allergique au lévonorgestrel ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé.

L'utilisation de LEVONORGESTREL VIATRIS est déconseillée dans les cas suivants :

- si vous avez eu une grossesse extra-utérine (ectopique),
- ou une infection des trompes utérines (salpingite),
- si vous avez des antécédents personnels ou familiaux d'un facteur de risque de thrombose connu (coagulation du sang),
- ou si vous avez une maladie grave de l'appareil digestif qui entrave l'absorption de la nourriture et des médicaments,
- ou si vous souffrez d'un dysfonctionnement hépatique grave ou d'un syndrome de malabsorption grave, comme la maladie de Crohn

Une grossesse ectopique antérieure et une infection antérieure des trompes utérines augmentent le risque d'une nouvelle grossesse ectopique. Par conséquent, si vous avez eu une grossesse ectopique ou une infection des trompes utérines, vous devez contacter votre médecin avant de prendre LEVONORGESTREL VIATRIS.

La contraception d'urgence ne doit être utilisée qu'occasionnellement et ne doit pas remplacer une méthode de contraception régulière étant donné que :

- elle ne permet pas d'éviter une grossesse dans tous les cas ;
- le risque de surdosage hormonal ou de troubles du cycle menstruel qu'elle entraîne n'est pas souhaitable en cas de prise régulière ;

La contraception d'urgence ne peut interrompre une grossesse.

Si vous avez eu un autre rapport sexuel non protégé qui date de plus de 72 heures, la conception peut avoir eu lieu. Le traitement par LEVONORGESTREL VIATRIS pris après un deuxième rapport sexuel peut être alors inefficace pour prévenir une grossesse.

Une administration répétée de LEVONORGESTREL VIATRIS au cours d'un même cycle menstruel est déconseillée du fait que votre cycle pourrait en être affecté.

LEVONORGESTREL VIATRIS ne fonctionne pas aussi bien que des méthodes régulières de contraception. Votre médecin peut vous en dire davantage quant aux méthodes de contraception à long terme, qui sont plus efficaces pour prévenir une grossesse.

Après la prise de ce médicament :

Il est indispensable d'exclure toute grossesse en faisant un test de grossesse :

- si vos règles ont plus de cinq jours de retard ;
- en cas de saignements anormaux, même à la date prévue de vos règles.

Chez toutes les femmes, le contraceptif d'urgence doit être pris le plus rapidement possible après le rapport sexuel non protégé. Certaines données suggèrent que LEVONORGESTREL VIATRIS serait moins efficace avec une augmentation du poids corporel ou de l'indice de masse corporelle (IMC), mais ces données sont limitées et non concluantes.

LEVONORGESTREL VIATRIS est donc toujours recommandé pour toutes les femmes quel que soit leur poids ou leur IMC.

Il vous est recommandé de vous adresser à un professionnel de santé si vous êtes préoccupée par des problèmes associés à la prise d'un contraceptif d'urgence.

Si vous n'avez pas utilisé un préservatif (ou s'il s'est déchiré ou qu'il a glissé) pendant vos rapports sexuels, il est possible que vous ayez contracté une maladie sexuellement transmissible ou le VIH. L'utilisation de la contraception d'urgence ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles et ne peut remplacer les précautions et les mesures nécessaires à prendre en cas de risque de transmission (voir Conseils / Education sanitaire).

Troubles psychiatriques

Certaines femmes qui utilisent des contraceptifs hormonaux dont LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ont fait état d'une dépression ou d'un état dépressif. La dépression peut être grave et parfois donner lieu à des idées suicidaires. Si vous présentez des changements d'humeur et des symptômes dépressifs, sollicitez les conseils de votre médecin dès que possible.

Enfants et adolescents

Ne pas utiliser ce médicament avant le premier saignement menstruel (la puberté).

Autres médicaments et LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris tout autre médicament, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance ou médicaments à base de plantes.

Certains médicaments peuvent empêcher LEVONORGESTREL VIATRIS d'agir correctement.

Si vous avez utilisé l'un des médicaments mentionnés ci-dessous au cours des 4 dernières semaines, LEVONORGESTREL VIATRIS peut être moins approprié pour vous. Votre médecin peut vous prescrire un autre type de contraceptif d'urgence (non hormonal), à savoir un dispositif intra-utérin (DIU-Cu). Si ceci n'est pas envisageable pour vous ou si vous ne parvenez pas à voir votre médecin rapidement, vous pouvez prendre une double dose de LEVONORGESTREL VIATRIS :

- les barbituriques et autres médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie (primidone, phénytoïne et carbamazépine, par exemple),
- les médicaments utilisés pour traiter la tuberculose (rifampicine, rifabutine, par exemple),
- un traitement contre l'infection à VIH (ritonavir, éfavirenz),
- un médicament utilisé pour traiter les infections fongiques (griséofulvine),
- les préparations à base de plantes médicinales contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien si vous avez besoin d'autres conseils sur la dose appropriée pour vous.

Consultez votre médecin dès que possible après avoir pris les comprimés pour obtenir des conseils sur un moyen fiable de contraception régulière et pour exclure une grossesse (Voir également la section 3 pour plus de conseils « Comment prendre LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ? »).

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre médecin.

LEVONORGESTREL VIATRIS peut également influencer sur la façon d'agir d'autres médicaments dont :

- un médicament appelé ciclosporine (il déprime le système immunitaire).

LEVONORGESTREL VIATRIS ne doit pas être utilisé en même temps que des médicaments contenant de l'ulipristal acétate.

LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse

Ce médicament n'interrompt pas une grossesse en cours.

Si malgré la prise de ce médicament une grossesse survient, les études disponibles à ce jour n'ont démontré aucun risque de malformation chez le fœtus en développement. Cependant, ce médicament ne doit pas être pris si vous êtes enceinte.

Si une grossesse survient après avoir pris LEVONORGESTREL VIATRIS, consultez votre médecin. Il se peut que ce dernier souhaite vérifier si la grossesse n'est pas ectopique (le bébé se développe en dehors de votre utérus). Ceci est particulièrement important si vous avez de fortes douleurs abdominales après avoir pris LEVONORGESTREL VIATRIS ou si vous avez déjà eu une grossesse ectopique, une intervention chirurgicale des trompes utérines ou une maladie inflammatoire pelvienne.

Allaitement

L'allaitement est possible. Toutefois, étant donné que le lévonorgestrel est excrété dans le lait maternel, il vous est conseillé d'allaiter immédiatement avant de prendre le comprimé de LEVONORGESTREL VIATRIS et d'éviter d'allaiter pendant au moins 8 heures après la prise de LEVONORGESTREL VIATRIS.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Après avoir pris LEVONORGESTREL VIATRIS, certaines femmes ressentent de la fatigue et des vertiges (voir rubrique 4 « QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS? ») : ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ressentez ces symptômes.

Il n'existe pas de données sur les effets de ce médicament sur les capacités individuelles à conduire un véhicule ou à utiliser une machine.

LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé contient du lactose monohydraté.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament comme décrit dans la notice ou en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

LEVONORGESTREL VIATRIS peut être pris à tout moment dans votre cycle menstruel dans la mesure où vous n'êtes pas déjà enceinte ou vous ne pensez pas l'être. Ne pas mâcher, mais avaler le comprimé en entier avec de l'eau.

Prenez le comprimé dès que possible, de préférence dans les 12 heures, et au plus tard 72 heures (3 jours) après avoir eu des rapports sexuels non protégés. Ne tardez pas à prendre le comprimé. Le comprimé est d'autant plus efficace que vous le prenez le plus tôt possible après avoir eu des rapports sexuels non protégés. Il peut empêcher une grossesse uniquement si vous le prenez dans les 72 heures qui suivent un rapport sexuel non protégé.

- Si vous utilisez l'un des médicaments qui peuvent empêcher LEVONORGESTREL VIATRIS de fonctionner correctement (voir section ci-dessus « Autres médicaments et LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ») ou si vous avez utilisé l'un de ces médicaments dans les 4 dernières semaines, LEVONORGESTREL VIATRIS peut agir de manière moins efficace pour vous. Votre médecin peut prescrire un autre type de contraceptif d'urgence (non hormonal), à savoir un dispositif intra-utérin au cuivre (Cu-DIU).

Si ceci n'est pas envisageable pour vous ou si vous ne parvenez pas à voir votre médecin rapidement, vous pouvez prendre une double dose de LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé (soit 2 comprimés pris simultanément).

- Si vous utilisez déjà une méthode de contraception régulière comme la pilule contraceptive, vous pouvez continuer à la prendre à vos heures régulières. Si vous n'avez pas vos règles à la fin de la plaquette, faites un test de grossesse pour vous assurer que vous n'êtes pas enceinte.

En cas de vomissements survenant dans les trois heures suivant la prise du comprimé, prenez immédiatement un autre comprimé.

Après utilisation de cette contraception d'urgence, il est vivement recommandé d'utiliser une méthode de contraception locale (préservatif, spermicide, cape cervicale) jusqu'à vos règles suivantes. Si un autre rapport sexuel non protégé a lieu après l'utilisation de LEVONORGESTREL VIATRIS (et si ceci se produit au cours du même cycle menstruel), les comprimés n'exerceront pas leur effet contraceptif et il y a à nouveau un risque de grossesse. L'utilisation de LEVONORGESTREL VIATRIS ne contre-indique pas la poursuite d'une contraception hormonale régulière.

Votre médecin peut également vous parler des méthodes de contraception à long terme, qui sont plus efficaces pour vous empêcher de tomber enceinte.

Si vous continuez à utiliser une méthode de contraception hormonale régulière, comme la pilule contraceptive, et que vous n'avez pas vos règles pendant la période sans pilules, consultez votre médecin pour vous assurer que vous n'êtes pas enceinte.

Vos premières règles après la prise de LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé

Après avoir utilisé LEVONORGESTREL VIATRIS, vos règles sont généralement normales et commenceront le jour prévu ; toutefois, il arrive que ce soit quelques jours plus tard ou plus tôt que d'habitude.

Si vos règles ont plus de 5 jours de retard ou sont anormalement légères ou abondantes, ou si vous pensez que vous pourriez être enceinte pour toute autre raison, vous devez vérifier si vous l'êtes en faisant un test de grossesse. Si une grossesse survient même après avoir pris ce médicament, il est important que vous consultiez votre médecin.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Sans objet.

Si vous avez pris plus de LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Aucune toxicité aiguë ni aucun effet nocif n'a été démontré pour ce médicament en cas d'ingestion de plusieurs doses. Toutefois, il se peut que vous vous sentiez mal, que vous soyez malade (vomissements) ou que vous ayez des saignements vaginaux. Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé :

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé :

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été observés :

Effets indésirables très fréquents (affectent plus d'une utilisatrice sur 10) :

- vertiges, maux de tête
- nausées, douleurs abdominales
- sensation de tension des seins, retard des règles, règles abondantes, saignements, douleurs de l'utérus
- fatigue

Effets indésirables fréquents (affectent une à dix utilisatrices sur 100) :

- diarrhée, vomissements
- règles douloureuses

Fréquence non connue (la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles) :

- Des cas d'évènements thromboemboliques (coagulation du sang) ont été rapportés après la mise sur le marché
- Des réactions allergiques comme un œdème de la gorge et du visage et une éruption cutanée peuvent se produire après avoir pris ce médicament.

- Dépression, état dépressif.

Effets indésirables supplémentaires chez les enfants et les adolescents

Sans objet.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur la plaquette après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration, LEVONORGESTREL VIATRIS doit être alors rapporté à votre pharmacien.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Le lévonorgestrel appartient à un groupe de médicaments appelés contraception d'urgence.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé

- La substance active est :

Lévonorgestrel.....
1,50 mg

Pour un comprimé

- Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, amidon de maïs, polyvinylpyrrolidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur

Chaque boîte de LEVONORGESTREL VIATRIS contient un comprimé rond, blanc à blanc-cassé, gravé « 145 » sur une face et lisse sur l'autre face.

Boîtes de 1, 5, 10, 25 ou 50 comprimé(s), sous plaquettes (PVC/PVDC/Aluminium).

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

VIATRIS SANTE

1 RUE DE TURIN
69007 LYON

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

VIATRIS SANTE

1 RUE DE TURIN
69007 LYON

Fabricant

MYLAN HUNGARY KFT.

H-2900
KOMAROM, MYLAN UTCA 1
HONGRIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Conseil d'éducation sanitaire :

a) Quelques informations sur le cycle menstruel et la contraception

Le cycle menstruel

Le cycle menstruel est le temps écoulé entre deux épisodes de règles. Normalement, le cycle dure 28 jours, bien que sa durée puisse varier de façon considérable d'une femme à l'autre. Les règles surviennent quand une femme n'est pas enceinte.

La fécondation

Au milieu du cycle, un ovule est expulsé par un des 2 ovaires (ce moment est appelé « ovulation »). En général, l'ovulation se produit au milieu du cycle mais elle peut se produire à n'importe quel moment du cycle.

Si des spermatozoïdes se trouvent au voisinage de l'ovule quand il est libéré, la « fécondation » (c'est-à-dire la rencontre de l'ovule et d'un spermatozoïde pour créer un embryon) peut avoir lieu.

Au bout de quelques jours, l'œuf fécondé va se fixer (ou « s'implanter ») dans l'utérus, et la grossesse commence.

La contraception

Les méthodes de contraception visent à empêcher :

- soit l'ovulation : c'est le cas de la pilule contraceptive,
- soit la fécondation (rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule) : c'est le cas des préservatifs,
- soit l'implantation si l'ovule est fécondé : c'est le cas du stérilet.

Les pilules pour la contraception d'urgence

Les pilules pour la contraception d'urgence visent à bloquer ou à retarder l'ovulation suite à un rapport sexuel non protégé. Elles sont inefficaces si l'ovulation a déjà eu lieu.

Chaque fois qu'une femme a un rapport sexuel sans utiliser de méthode de contraception, la possibilité d'une grossesse ne peut être exclue.

Si vous avez utilisé ce médicament et que vous n'utilisez pas de méthode de contraception régulière, il vous est vivement recommandé de consulter votre médecin ou votre centre de planning familial pour obtenir des conseils quant à une méthode de contraception adaptée à votre cas.

b) Conseils en cas de risque de transmission d'une maladie sexuellement transmissible

Si vous avez des rapports sexuels non protégés, vous courez le risque de contracter une maladie sexuellement transmissible, particulièrement si vous ne connaissez pas les antécédents sexuels de votre partenaire ou si vous avez plusieurs partenaires. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien, votre médecin ou votre centre de planning familial ou appelez l'un des numéros suivants :

- fil santé jeunes : 0800 235 236, service anonyme et gratuit, tous les jours de 9h à 23h, www.filsantejeunes.com
- sida info service : 0 800 840 800

Glossaire

- Grossesse extra-utérine : grossesse qui se développe en dehors de l'utérus, généralement dans l'une des trompes utérines. Les signes d'alarme sont des douleurs abdominales persistantes, un retard des règles, des saignements vaginaux, des signes de grossesse (nausées, sensation de tension des seins). Ces symptômes doivent amener à consulter immédiatement votre médecin.
- Salpingite : infection des trompes utérines. Les symptômes comprennent des douleurs abdominales, de la fièvre, et d'importantes pertes vaginales.

En résumé

Les points importants	Conduite à tenir
L'utilisation de LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé doit rester exceptionnelle.	
LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé peut être utilisé à n'importe quel moment du cycle.	
La prise de LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé est déconseillée si vous avez eu une grossesse extra utérine ou si vous avez eu dans le passé une salpingite.	En cas de doute, ou si vos règles vous paraissent anormales, ou si vos règles n'arrivent pas, ou si vous avez des douleurs abdominales, consultez votre médecin.
Le comprimé doit être pris le plus tôt possible après le rapport sexuel non protégé.	
Le traitement nécessite la prise d'un seul comprimé.	Si vous avez vomi dans les 3 heures qui suivent la prise du comprimé, un autre comprimé doit être pris immédiatement.
LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé n'est efficace que 7 à 9 fois sur 10.	Si vous avez un retard de règles de plus de 5 jours par rapport à la date attendue, faites un test de grossesse pour vous assurer que vous n'êtes pas enceinte.
Après la prise de LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé, il faut utiliser une contraception locale jusqu'aux règles suivantes. Si vous avez utilisé ce médicament en raison d'un oubli de pilule contraceptive, vous devez continuer à prendre la plaquette en cours jusqu'à la fin.	Si vous n'avez pas vos règles à la fin de la plaquette suivante, il faut vous assurer que vous n'êtes pas enceinte.
La prise de LEVONORGESTREL VIATRIS 1,5 mg, comprimé n'évite pas le risque de maladie sexuellement transmissible (notamment le sida).	En cas de doute, consultez votre médecin ou appelez un des N° suivants : Fil santé jeunes : 0800 235 236, service anonyme et gratuit, tous les jours de 9h à 23h, www.filsantejeunes.com Sida info service : 0800 840 800